

Ihre Patientin/Ihr Patient

ist antikoaguliert und nimmt einen Plättchenaggregationshemmer

Jegliche Biopsieentnahme oder Eingriff ist unter der laufenden Behandlung nicht möglich. Rein diagnostische Untersuchungen (ohne Biopsieentnahme) können erfolgen.

Wir möchten Sie bitten, mit dem behandelnden Kardiologen/Angiologen Kontakt aufzunehmen.

Eine **Gastroskopie** (mit Biopsieentnahme) ist möglich:

- unter OAK (INR 2-3)
- NOAK (Einnahme nicht am Untersuchungstag)
- ASS, Plavix oder Kombination von beiden
- ASS plus PY2P12-Inhibitor

Eine **Koloskopie** oder Gastroskopie mit Eingriff ist nur möglich unter einfacher Plättchenaggregation mit Aspirin oder Plavix, wobei das Plavix nach Möglichkeit durch Aspirin ersetzt werden sollte. Die OAK müsste gestoppt, respektive ein Bridging erfolgen.

Wir möchten Sie bitten, das Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen und uns den Entscheid mitzuteilen.

Wir danken für die Zusammenarbeit und stehen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.